

# Choose the right IcePower

УСЛОВИЕ	Cold Gel	Plus MSM Cold Gel	Sport Spray	Cold Spray	Instant Cold or Cold Pack	Arthro creme - for joints	HOT Gel
Растяжение связок, вывихи, разрывы	Наносить каждые 3-6 часов в течение 1-14 дней		Первая помощь при легких травмах, в более тяжелых случаях применять в виде хлаждающего геля	Первая помощь: Распыляйте в течение 5 сек с интервалом каждые 30 сек	Первая помощь или по мере необходимости в комбинации с охлаждающим гелем		Профилактика
Кровоизлияния, гемотомы	Наносите каждые 3-6 часов в течение 1-14 дней		Первая помощь при легких травмах, в более тяжелых случаях применять в виде хлаждающего геля	Первая помощь: Распыляйте в течение 5 сек с интервалом каждые 30 сек	Первая помощь или по мере необходимости в комбинации с охлаждающим гелем		
Боль шеи, плечевого сустава, спины, ишиалгия	При проявление симптомов каждые 3-6 часов, также для длительного использования	При проявление симптомов каждые 3-6 часов, особенно при затяжных болях	Использование в качестве охлаждающего геля		При остром приступе вместе с охлаждающим гелем в течение 1-3 дней		Лечение затяжных болей после охлаждающего геля
Лучеплечевой бурсит тендинит (воспаление ткани сухожилия)	Наносить каждые 3-6 часов в течение 1-14 дней и по необходимости	Наносить каждые 3-6 часов в течение 1-14 дней и по необходимости	Использовать охлаждающий гель с эластичной повязкой		При остром приступе вместе с охлаждающим гелем в течение 1-3 дней		
Артрит, артроз и ревматические боли	При проявление симптомов уменьшение отека и болевых ощущений	При проявление симптомов каждые 3-6 часов, особенно при постоянных затяжных болях			При проявление симптомов уменьшение отека и болевых ощущений	Массаж 1-2 раза в день в течение месяца; также предназначен для длительного использования	Лечение затяжных болей после охлаждающего геля
Перелом	Использовать для уменьшение отека		Использовать для уменьшения отека	Оказании первой помощи Распылять в течение 5 сек с интервалом в 30 сек	Для оказания первой помощи	 	
Незначительные ожоги, солнечные ожоги	Использовать спрей IcePower Sport		Оказание первой помощи; наносить каждые три часа	Оказании первой помощи Распылять в течение 5 сек с интервалом в 30 сек	Для оказания первой помощи		
Мышечное перенапряжение, болевой шок	При проявления симптомов каждые 3-6 часов; для длительного применения	При проявления симптомов каждые 3-6 часов, особенно при постоянных затяжных болях	При проявления симптомов каждые 3-6 часов; для длительного применения				
Нарастающая боль	При проявления симптомов каждые 3-6 часов, в целях профилактики перед сном		При проявления симптомов каждые 3-6 часов, в целях профилактики перед сном				